

# আপনার শিশুকে কখন শিশু জরুরি বিভাগে নিয়ে যেতে হবে


এর আগে অবশ্যই  
SNS24-এ কল করুন



808 24 24 24



## জ্বর



৩ মাসের কমবয়সে:  
পায়ু পথের তাপমাত্রা  $\geq 38^{\circ}\text{C}$  বা বগলের নিচের তাপমাত্রা  $\geq 39.6^{\circ}\text{C}$

৩-৬ মাস বয়সে:  
পায়ু পথের তাপমাত্রা  $\geq 38^{\circ}\text{C}$  বা বগলের নিচের তাপমাত্রা  $\geq 39^{\circ}\text{C}$

৬ মাসের বেশ বয়সে:  
পায়ু পথের তাপমাত্রা  $\geq 38.5^{\circ}\text{C}$  বা বগলের নিচের তাপমাত্রা  $\geq 38^{\circ}\text{C}$

জ্বরের সাথে যদি থাকে:

- ছকের অস্বাভাবিক রঙ (চামড়ায় ছোপ পড়া)
- ঠোঁট ও নখ নীল হয়ে যাওয়া
- অস্বস্তি বা অতিরিক্ত বিরক্তি
- জ্বরের প্রথম ২৪-৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ছকে ফুসকুড়ি

## কার্ডিও-রেসপিরেটরি সমস্যা



- বুকের ব্যথা
- গোঙানির শব্দ
- ছকের বিবর্ণতা, ঠোঁট বা আঙুল নীল হওয়া
- শ্বাসকষ্ট:
  - অত্যন্ত দ্রুত শ্বাস নেওয়া বা দীর্ঘ শ্বাসের বিরতি (২০ সেকেন্ড)
  - বমির কারণ হওয়া স্থায়ী কাশি বা অতিরিক্ত লালানিঃসরণ
  - পাঁজরের মাঝখানে খাঁজ তৈরি হওয়া
  - স্থায়ী শ্বাসকষ্টজনিত শব্দ (শ্বাস নিতে শব্দ হওয়া)

## দুর্ঘটনা

### আঘাত



- হাড় ভেঙ্গে গেলে (হাড় দৃশ্যমান), বিকৃতি, বা তীব্র ও স্থায়ী ব্যথা
- গভীর ক্ষত বা ১০ মিনিট চাপ দেওয়ার পরও রক্তপাত বন্ধ না হওয়া
- মাথায় আঘাতের পর জ্ঞান হারানো, লাগাতার বমি, নাক বা কান থেকে অতিরিক্ত রক্তপাত, স্নায়বিক বা আচরণগত পরিবর্তন, বা বড় ক্ষত/ আঘাত

### বিষাক্ত পদার্থ

- প্রেসক্রিপশন ছাড়া ওষুধ বা বিষাক্ত পদার্থ খাওয়া
- তীক্ষ্ণ বস্তু, ব্যাটারি বা চুম্বক গেলা
- বিষাক্ত পদার্থ বা বস্তু শ্বাসের মাধ্যমে গ্রহণ

## মারাত্মক অ্যালার্জি

### অ্যালার্জেনের সংস্পর্শে আসুক বা না আসুক



- হঠাৎ ছকে ফুসকুড়ি হওয়া
- ঠোঁট/চোখের পাতা ফুলে যাওয়া
- শ্বাসকষ্ট
- বমি/ডায়রিয়া



## স্নায়বিক বা আচরণগত পরিবর্তন

- অজ্ঞান হয়ে যাওয়া
- ঝিম ধরা, অতিরিক্ত বিরক্তি, বা থামানো না যাওয়া কান্না
- অস্বাভাবিক আন্দোলন (খিঁচুনি)
- পেশির শক্তি হারানো, হাঁটতে অস্বীকার, বা ভারসাম্যহীনতা
- দিশাহীনতা, কথায় অসঙ্গতি, বা দৃষ্টির সমস্যাসহ পরিবর্তন
- ঘুম থেকে উঠে মাথাব্যথা হওয়া, সাথে বমি বা আচরণগত পরিবর্তন আত্মহত্যার চিন্তার প্রকাশ
- যদি বয়স ৩ মাসের কম এবং একটানা দুবার বুকের দুধ খেতে অস্বীকার করে বা কষ্ট হয়

## হজম ও অন্ত্রের পরিবর্তন



- যদি শিশুর বয়স ৩ মাসের কম হয় এবং সে একটানা দুবারের বেশি বুকের দুধ খেতে অস্বীকার করে বা কষ্ট হয়
- অবিরাম বমি, যেটা আংশিক পানি দ্বারা উপশম হয় না
- তীব্র ও স্থায়ী পেট ব্যথা, যার মাঝে আরাম পাওয়ার সময় নেই
- বমি এবং/অথবা পায়খানার সঙ্গে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে রক্ত থাকা

### পানিশূন্যতার লক্ষণ:

- প্রস্রাবের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাওয়া
- চোখ ভিতরে ঢুকে যাওয়া
- জিভ শুকিয়ে যাওয়া
- কান্না হলেও চোখে জল না আসা
- ঝিমুনি ভাব
- অতিরিক্ত বিরক্তি

## যৌনাঙ্গ বা প্রস্রাবের সমস্যা



- অণুকোষে ব্যথা
- প্রস্রাব করতে ব্যথা, প্রস্রাব লাল বা অতিরিক্ত ফেনাযুক্ত
- পানির চাহিদা এবং প্রস্রাবের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যাওয়া

## ছক, মিউকাস ঝিল্লি এবং জয়েন্টের সমস্যা



- চাপ দিলেও মিলিয়ে না যাওয়া দাগ
- ব্যাখ্যাতীত একাধিক ক্ষত/রক্তজমাট
- ঠোঁট, চোখের পাতা, মুখ, হাত বা পায়ে ফোলা
- রক্তপাত বন্ধ না হওয়া
- সন্ধিস্থল ফোলা, সাথে লালভাব, উষ্ণতা, ব্যথা এবং নড়াচড়ায় সীমাবদ্ধতা

সন্দেহ হলে, স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যোগাযোগ করুন এবং সবসময় SNS24-এ কল

